DAN®
DIVERS ALERT NETWORK

LÍNEA DE EMERGENCIA DE DAN (24/7)
+52-557-100-0540

¿BUZO CON SÍNTOMAS DESPUÉS DE BUCEAR?

Las lesiones por buceo pueden manifestarse con síntomas sutiles.
Considere una lesión o enfermedad relacionada con el buceo.

PREGUNTE: ¿El paciente buceó en las últimas 24 horas?

SÍNTOMAS COMUNES	SÍNTOMAS GRAVES
• Dolor en extremidades (por lo general en codos u hombros) • Sarpullido o manchas moradas en la piel • Parestesias no dermatomales • Cansancio o malestar	• Debilidad muscular • Vértigo • Parálisis • Confusión o pérdida del conocimiento • Entumecimiento o parestesias dermatomales • Falta de aire

MOMENTO DE APARICIÓN DE LOS SÍNTOMAS

La mayoría de los síntomas aparecen dentro de las 6-8 horas posteriores al buceo.
Un inicio más temprano suele indicar mayor gravedad.
Un inicio tardío y síntomas leves, suelen indicar menor urgencia y mejor pronóstico.

ACCIONES INMEDIATAS ANTE SOSPECHA DE LESIÓN POR BUCEO

1. Administrar oxígeno al 100% (FiO_2 más alta disponible)
2. Hidratar (si no está contraindicado) — evitar dextrosa
3. Realizar una evaluación neurológica enfocada
4. Obtener imágenes de tórax si hay síntomas pulmonares o se sospecha embolia arterial gaseosa (EAG)
5. Llamar a DAN para solicitar asesoría



INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA EVALUACIÓN

- Profundidad, tiempo, número de inmersiones, número de días buceando
- Cualquier incidente u obligaciones descompresivas
- Profundidad máxima alcanzada en la serie de buceos
- Número de identificación de DAN (si hubiera)

Escanee para ver recursos adicionales

NO RETRASE LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO NI RESTE IMPORTANCIA A SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS LEVES

LÍNEA DE EMERGENCIA DE DAN +52-557-100-0540

Divers Alert Network (DAN) es una organización sin fines de lucro 501 (c)(3), fundada en 1980, que apoya el manejo médico de lesiones por buceo. Una consulta inmediata con médicos de DAN puede ayudar a definir el diagnóstico, el traslado y las necesidades de tratamiento hiperbárico.